

## Anbauzahlen von Futtererbse und Ackerbohne

Jahre	Anbaufläche in ha		Ertrag dt/ha	
	Futtererbse n	Ackerbohnen	Futtererbse n	Ackerbohnen
2009	964	1.492	29,6	32,5
2010	715	1.372	29,6	40,7
2011	1.031	1.567	39,1	41,9
2012	833	1.648	41,8	40,8
2013	1.006	1.802	39,8	47,1
2014	1.300	1.997	48,1	57,3
2015	1.347	4.383	40,5	44,5
2016*	2.700	6.100	35,8	45,3

\* = vorläufige Ergebnisse

# Ergebnisse LSV Futtererbsen 2013 - 2016

- Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Marsch, Geest, Hügelland Nord			
Jahr		2013	2014	2015	2016
Zahl der Versuche		3	3	3	2
Sorte	Züchter				
Respect	Intersaat	92	92	97	94
Navarro	NPZ/ SU	104	104	99	103
Astronaute	NPZ/ SU	–	102	103	103
Salamanca	NPZ/ SU	100	102	99	106
Alvesta	KWS Lochow	103	101	–	–
<b>Standard dt/ha</b>		<b>54,5</b>	<b>62,6</b>	<b>56,8</b>	<b>55,1</b>

## Ergebnisse LSV Futtererbsen 2013 - 2016

- Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Sand- und Lehmböden Nordwest			
Jahr		2013	2014	2015	2016
Zahl der Versuche*		3	3	2	2
Sorte	Züchter				
Respect	Intersaat	94	97	93	98
Navarro	NPZ/ SU	97	102	104	108
Astronaut	NPZ/ SU	–	103 <sup>2</sup>	105	95
Salamanca	NPZ/ SU	–	–	–	109 <sup>1</sup>
Alvesta	KWS Lochow	104	102	98	99
<b>Standard dt/ha</b>		<b>65,1</b>	<b>56,5</b>	<b>61,3</b>	<b>42,9</b>

\* = bei Abweichungen ist die Anzahl direkt angegeben 102<sup>2</sup>

# Ergebnisse LSV Futtererbsen 2016 - Eigenschaften

Quelle: Alle Versuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche bundesweit (Angaben in ha)			TKG	Rohprotein-gehalt	Kornfarbe	Pflanzenlänge (+ = lang)	Festigkeit gegen		
			2014	2015	2016					Lager	Botrytis	Brennflecken
Respect	EU (2007)	mfr	432	720	735	-	o	gelb	++	++	o	1)
Navarro	2010	mfr	173	219	154	+	+	gelb	o	o	1)	1)
Astronaut	2013	fr	85	595	1412	o	+	gelb	+	o	1)	1)
Salamanca	2009	fr	201	314	302	o	o	gelb	++	+	1)	1)
Alvesta	2008	fr	826	1450	1346	+	o	gelb	o	o	o	1)

- = unterdurchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

o = durchschnittlich

1) = bisher nicht ermittelt, oder nicht eingestuft

## Ergebnisse LSV Ackerbohnen 2013 - 2016

- Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Küstenregion			
Jahr		2013	2014	2015	2016
Zahl der Versuche*		4	7	7	6
Sorte	Züchter				
Fuego	NPZ/S.U.	101	105 <sup>6</sup>	106	107
Fanfare	NPZ/S.U.	104	106	102	102
Taifun t	NPZ/S.U.	92	93	96	88
Boxer	PHP/ S.U.	–	–	103	100
Tiffany v	NPZ/S.U.	–	–	100	103
Pyramid	Limagrain	99	98	96	–
<b>Standard dt/ha</b>		<b>61,8</b>	<b>69,0</b>	<b>61,2</b>	<b>69,9</b>

\* = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z.B. 99<sup>2</sup> (t)= tanninfrei ; (v)= vicin- und convicinfrei

## Ergebnisse LSV Ackerbohnen 2013 - 2016

- Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Lehmböden West			
Jahr		2013	2014	2015	2016
Zahl der Versuche*		3	3	4	4
Sorte	Züchter				
Fuego	NPZ/S.U.	105	104	105	101,4
Fanfare	NPZ/S.U.	108	99	105	102,6
Taifun	t NPZ/S.U.	95	95	97	95,1
Boxer	PHP/ S.U.	–	–	103	95,4
Tiffany	v NPZ/S.U.	–	–	105 <sup>2</sup>	105,5
Pyramid	Limagrain	102	102	100	100,6
<b>Standard dt/ha</b>		<b>59,9</b>	<b>49,1</b>	<b>57,2</b>	<b>60,5</b>

\* = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z.B. 99<sup>2</sup> (t)= tanninfrei ; (v)= vicin- und convicinfrei

## Ergebnisse LSV Ackerbohnen 2016 - Eigenschaften

Quelle: Alle Versuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche bundesweit (Angaben in ha)			TKG	Rohprotein-gehalt	Pflanzenlänge (+=kurz)	Festigkeit gegen*			
			2014	2015	2016				Lager	Botrytis	Rost	Ascochyta
Fuego	2004	m	712	922	816	++	o	o	++	o	o	o
Fanfare	2012	m	294	771	1155	+	+	o	+	o	o	o
Taifun (t)	EU (2011)	m	115	83	104	o	o	+	+	o	-	1)
Boxer	EU (2012)	m	6	56	14	+	o	o	+	o	o	1)
Tiffany (v)	2015	m	-	80	212	+	+	-	+	1)	o	1)
Pyramid	EU (2008)	mfr	34	53	13	++	-	o	+	o	+	o

- = unterdurchschnittlich    + = überdurchschnittlich    o = durchschnittlich    1) = bisher nicht ermittelt bzw. nicht eingestuft

t= tanninfrei, v= vicin- und convicinfrei    \*= Einstufungen vorwiegend auf Basis Beschreibende Sortenliste des BSA