

Tabelle 1: Übersicht über die zwei Futtergruppen

		Kontrollgruppe		Versuchsgruppe 11% RP ab 100 kg		
		RAM		RAM		
Mast- abschnitt	kg	2.1 28-65	2.2 65-122	2.1 28-65	2.2 65-100	2.2 a 100-122
Rohprotein	%	17,0	14,0	17,0	14,0	11,0
Lysin	%	1,10	0,95	1,10	0,95	0,95
Phosphor	%	0,47	0,43	0,47	0,43	0,37
ME	MJ/kg	13,4	13,0	13,4	13,0	12,8

Das Aminosäurenverhältnis (Lysin: Methionin+Cystin: Threonin: Tryptophan: Valin) wurde auf 1: 0,55:0,65:0,18:0,65 eingestellt.

Tabelle 2: Futteranalysen

		RAM 2.1	RAM 2.2	RAM 2.2 a
Rohprotein	%	17,1	14,1	11,5
ME	MJ/kg	13,4	13,3	13,1
Phosphor	%	0,48	0,40	0,37
Lysin	%	1,13	0,92	0,96
Methionin + Cystin	%	0,60	0,56	0,54
Threonin	%	0,72	0,63	0,65
Lysin/ME	g/MJ	0,84	0,69	0,73

Tabelle 3: Mastleistung und Schlachtkörperbewertung

		Kontrollgruppe	Versuchsgruppe 11 % RP ab 100 kg
Anzahl Tiere		58	58
Anfangsgewicht	kg	29,2	29,2
Endgewicht	kg	122,6	122,3
Tageszunahmen	g	964	949
Futtermittelverbrauch/kg Zuwachs	kg	2,56 ^a	2,62 ^b
Futtermittelverbrauch/Tag	kg	2,47	2,48
Schlachtkörpergewicht	kg	97,4	97,1
Schlachtausbeute	%	79,4	79,4
Schinken	kg	18,7	18,7
Lachs	kg	7,4	7,4
Schulter	kg	9,1	9,1
Bauch	kg	13,8	13,9
MFA Bauch	%	56,8	56,2
Speckmaß	mm	14,6	15,2
Fleischmaß	mm	65,7	66,4
Indexpunkte/kg		1,008 ^a	0,994 ^b