

Anbaufläche Sommergerste in Niedersachsen

Jahre	Anbaufläche Sommergerste in ha	% der Ackerfläche	Ertrag dt/ha
2009	45.396	2,4	51,8
2010	32.519	1,7	44,4
2011	44.077	2,3	50,2
2012	67.140	3,6	59,0
2013	42.436	2,3	58,9
2014	38.068	2,0	61,4
2015	44.900	2,4	59,0
2016	49.800	2,7	57,0
2017	45.900	2,4	54,2

Sortenempfehlungen LSV Sommer-Futtergerste 2017

Sorte	im Handel seit	Vermehrungsfläche 2017 in D	Anbauempfehlung für Anbauregion	Ertragsleistung	Qualitäten				Festigkeit gegen						
					TKG	Marktware >2.2 mm	Rohprotein-gehalt (+=hoch)	Hekto-liter-gew.	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Zwergrost	Netzflecken
drei- und mehrjährig geprüfte Sorten															
Salome	2011	101	(X)	o	o	+	--	+	-	o	-	++	o	o	+
Vespa	2012	191	(X)	o	+	+	--	+	o	+	o	++	o	-	o
Sydney	2013	70	(X)	o	o	+	--	+	o	+	o	++	o	+	o
KWS Dante	2013	42	(X)	o	o	+	--	+	+	+	+	++	o	o	o
zweijährig geprüfte Sorten															
RGT Planet	2014	1617	X	+	+	+	--	o	+	+	o	++	+	+	+
einjährig geprüfte Sorten															
KWS Fantex*	2016	13		o	o	+	--	o	+	o	o	++	o	+	+

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich - = unterdurchschnittlich *=vorläufige Beurteilung
X = generelle Empfehlung, (X) = eingeschränkte Empfehlung

Ergebnisse LSV Sommer-Futtergerste 2014 - 2017

Relativerträge - Sorten - Jahre (behandelte Stufe)

Standortgruppe		Sand- und Lehmstandorte Nordwest					
Jahr		2014	2015	2016	2017	mehrj. Ergebnisse 2014-2017 LSV + WP Ergebnisse	
Zahl Versuche		8	6	5	5	rel.	Anz. Vers.
Sorte	Züchter						
Salome	* Nordsaat/ SU	101	102	101	98	99	25
Vespa	* Limagrain	102	98	100	99	99	25
Sydney	* Streng/ IG	101	101	100	100	100	25
KWS Dante	* KWS Getreide	101	100	103	101	100	25
RGT Planet	* RAGT	-	-	103	104	103	28
KWS Fantex	* KWS Getreide	-	-	-	98	99	10
Standard dt/ha		86,2	78,2	68,6	79,2	80,0	

* =Sorten des Standardmittels

Ergebnisse LSV Sommer-Futtergerste 2017 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche bundesweit (Angaben in ha)			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Marktware >2.2 mm	Rohprotein-gehalt (+=hoch)	Halm-länge (+=kurz)	Festigkeit gegen						
												Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Zwergrost	Netzflecken
			2015	2016	2017													
Salome	2011	m	316	281	101	++	o	o	+	--	++	-	o	-	++	o	o	+
Vespa	2012	m	240	207	191	o	+	+	+	--	+	o	+	o	++	o	-	o
Sydney	2013	m	159	127	70	++	-	o	+	--	++	o	+	o	++	o	+	o
KWS Dante	2013	m	24	20	42	+	o	o	+	--	++	+	+	+	++	o	o	o
RGT Planet	2014	msp	954	1140	1617	+	+	+	+	--	+	+	+	o	++	+	+	+
KWS Fantex*	2016	msp	-	7	13	+	+	o	+	--	+	+	o	o	++	o	+	+

o = durchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

- = unterdurchschnittlich

*=vorläufige Beurteilung