

Anbauzahlen von Futtererbsen und Ackerbohnen in Niedersachsen

Jahre	Anbaufläche in ha		Ertrag dt/ha	
	Futtererbsen	Ackerbohnen	Futtererbsen	Ackerbohnen
2009	964	1.492	29,6	32,5
2010	715	1.372	29,6	40,7
2011	1.031	1.567	39,1	41,9
2012	833	1.648	41,8	40,8
2013	1.006	1.802	39,8	47,1
2014	1.300	1.997	48,1	57,3
2015	1.347	4.383	40,5	44,5
2016	2.900	5.300	35,2	42,4
2017*	2.100	5.500	36,9	50,2

* = vorläufige Ergebnisse

Sortenempfehlung Futtererbsen 2017

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche 2017 in D	Anbauempfehlung für Anbauregion		Ertragsleistung		Qualitäten*			Pflanzenlänge* (+ = lang)	Festigkeit gegen*		
				Marsch-Standorte	Lehm-böden West	Marsch-Standorte	Lehm-böden West	TKG	Roh-protein-gehalt	Korn-farbe		Lager	Botrytis	Brenn-flecken
Respect	EU (2007)	mfr	378	(X)	(X)	-	-	o	o	gelb	++	++	1)	1)
Navarro	2010	mfr	45	X	X	+	+	+	o	gelb	o	o	1)	1)
Astronaut	2013	fr	1815	X	X	+	+	o	+	gelb	+	+	1)	1)
Salamanca	2009	mfr	442	X	X	+	o	o	o	gelb	++	+	1)	1)
LG Amigo	2016	mfr	29			o	o	-	o	gelb	o	o	1)	1)
Alvesta	2008	fr	1014			/	o	o	o	gelb	o	o	1)	1)

- = unterdurchschnittlich + = überdurchschnittlich o = durchschnittlich / = keine Prüfung in der Anbauregion 1) = bisher nicht ermittelt, oder nicht eingestuft
 X = generelle Empfehlung (X) = Anbauempfehlung aufgrund sehr guter Standfestigkeit bei allerdings schwächerer Ertragsleistung *= Einstufungen vorwiegend auf Basis Beschreibende Sortenliste des BSA

Ergebnisse LSV Futtererbsen 2014 - 2017 - Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Marsch, Geest, Hügelland Nord					
Jahr		2014	2015	2016	2017	mehrj. Ergebnisse 2014-2017 LSV + WP Ergebnisse	
						rel.	Anz. Vers.
Zahl der Versuche		3	3	2	2		
Sorte	Züchter						
Respect	* Intersaat/BayWa	92	97	94	96	94	10
Navarro	* NPZ/ SU	104	99	103	102	102	10
Astronaut	* NPZ/ SU	102	103	103	102	102	10
Salamanca	* NPZ/ SU	102	99	106	99	102	8
LG Amigo	* Limagrain	–	–	–	101	99	4
Standard dt/ha		63	57	55	68	62	

* = Varianten des Standardmittels,

Ergebnisse LSV Futtererbsen 2014 - 2017 - Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Sand und Lehmböden Nordwest					
Jahr		2014	2015	2016	2017	mehrj. Ergebnisse 2014-2017 LSV + WP Ergebnisse	
Zahl der Versuche ¹⁾		3	2	2	3	rel.	Anz. Vers.
Sorte	Züchter						
Respect	* Intersaat/BayWa	97	93	98	103	96	17
Navarro	* NPZ/ SU	102	104	108	97	101	17
Astronaut	* NPZ/ SU	103	105	95	104	104	16
Salamanca	* NPZ/ SU	–	–	109 ¹	97	100	5
LG Amigo	* Limagrain	–	–	–	98	100	6
Alvesta	KWS Lochow	102	98	99	99	99	12
Standard dt/ha		57	61	43	44	53	

* = Varianten des Standardmittels, ¹⁾ = bei Abweichungen ist die Anzahl direkt angegeben 102²

Sortenempfehlung Ackerbohnen 2017

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche 2017 in D	Anbauempfehlung für Anbauregion		Ertragsleistung		Qualitäten*		Festigkeit gegen*			
				Marsch-Standorte	Lehm-böden West	Marsch-Standorte	Lehm-böden West	TKG	Roh-protein-gehalt	Lager	Botrytis	Rost	Asco-chyta
Fuego	2004	m	801	X	X	+	+	++	o	++	o	o	o
Fanfare	2012	m	708	X	X	+	+	+	o	+	o	-	o
Taifun (t)	EU (2011)	m	151			-	-	o	+	+	o	-	o
Tiffany(v)	2015	m	503	X	X	+	++	+	+	+	o	o	¹⁾
Birgit	2016	m	32	(X)		+	o	+	+	+	¹⁾	¹⁾	¹⁾

- = unterdurchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

o = durchschnittlich

¹⁾ = bisher nicht ermittelt bzw. nicht eingestuft

t= tanninfrei, v= vicin- und convicinfrei * = Einstufungen vorwiegend auf Basis Beschreibende Sortenliste des BSA

X = allgemeine Empfehlung (X) = eingeschränkte Empfehlung

Ergebnisse LSV Ackerbohnen 2014 - 2017 - Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Küstenregion					
Jahr		2014	2015	2016	2017	mehrj. Ergebnisse 2014-2017 LSV + WP Ergebnisse**	
Zahl der Versuche*		7	7	6	7	rel.	Anz. Vers.
Sorte	Züchter						
Fuego	NPZ/S.U.	105 ⁶	106 ⁶	107	103	102	20
Fanfare	NPZ/S.U.	106	102	102	105	103	20
Taifun t	NPZ/S.U.	93	96	88	87	90	20
Tiffany v	NPZ/S.U.	–	100	103	101	102	19
Birgit	PHP/S.U.	–	–	–	104	102	9
Standard dt/ha		69	61	70	76	69	

* = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z.B. 99²; ** = Standorte aus SH standen aus 2014 bis 2016 nicht vollständig für mehrj. Verrechnung zur Verfügung
(t)= tanninfrei ; (v)= vicin- und convicinfrei

Ergebnisse LSV Ackerbohnen 2014 - 2017 - Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Lehmböden West					
Jahr		2014	2015	2016	2017	mehrj. Ergebnisse 2014-2017 LSV + WP Ergebnisse	
Zahl der Versuche		3	4	4	6	rel.	Anz. Vers.
Sorte	Züchter						
Fuego	NPZ/S.U.	104	105	101	99	101	19
Fanfare	NPZ/S.U.	99	105	103	103	102	19
Taifun	t NPZ/S.U.	95	97	95	95	94	19
Tiffany	v NPZ/S.U.	–	105 ²	106	104	105	18
Birgit	PHP/S.U.	–	–	–	99	98	12
Standard dt/ha		49	57	60	44	51	

* = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z.B. 992 (t)= tanninfrei ; (v)= vicin- und convicinfrei