

## Anbaufläche und Erträge Sommerweizen

Jahre	Anbaufläche in ha	% der Ackerfläche	Ertrag dt/ha
2009	5.493	0,3	52,1
2010	4.260	0,2	46,8
2011	7.620	0,4	55,3
2012	53.827	2,9	66,6
2013	6.890	0,4	55,9
2014	4.780	0,3	55,6
2015	5.600	0,3	59,5
2016*	6.600	0,4	60,4

\* vorläufige Zahlen

## LSV Sommerweizen 2013 - 2016 - Relativerträge Marschen und Lehmböden

### Relativerträge - Sorten - Jahre

Standortgruppe		Marschstandorte				Lehmige Standorte Nordwest			
Jahr		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Zahl der Versuche		3	3	3	2	4	5	5	4
Sorte	Züchter								
E Sonett	Syngenta	98	–	–	–	96	100	–	97
Granus	Strube/ SU	99	96	94	94	99	93	–	–
A Tybalt	* Eckendorf/SU	101	106	103	96	105	102	100	98
Cornetto	Secobra/ BayWa	–	99	100	100	–	101	101	95
Quintus	* Eckendorf/SU	–	108	106	106	–	106	102	104
Licamero	* Secobra/ BayWa	–	–	97	102	–	–	102	103
KWS Mistral	* KWS Getreide	–	–	–	96	–	–	–	95
KWS Chamsin	KWS Getreide	104	93	94	–	100	99	95	94
<b>Standard dt/ha</b>		<b>92,2</b>	<b>93,9</b>	<b>93,5</b>	<b>84,1</b>	<b>81,0</b>	<b>78,3</b>	<b>73,5</b>	<b>79,8</b>

\* = Varianten des Standardmittels

## LSV Sommerweizen 2016 - Eigenschaften der geprüften Sorten

Quelle: Alle Versuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt

	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche bundesweit (Angaben in ha)			Ähren je m <sup>2</sup>	Körner je Ähre	TKG	Halm-länge (+=kurz)	Festigkeit gegen					
			2014	2015	2016					Lager	Mehltau	Blatt-septoria	Braunrost	Gelbrost	Ährenfusarium
Sonett	2010	mfr	113	113	125	+	o	-	o	o	+	o	o	++	-
Granus	2011	m	138	143	55	o	o	o	+	+	-	o	+	o	o
Tybalt	2004	m	211	247	184	o	o	+	++	o	++	-	+	+	-
Cornetto	2013	m	36	131	108	-	+	++	o	o	++	-	+	o	+
KWS Chamsin	2008	m	322	276	214	-	+	+	++	++	o	o	-	-	o
Quintus	2013	m	17	82	224	o	o	+	o	o	o	+	++	++	++
Licamero	2014	m	6	50	42	o	o	++	+	o	+	o	-	+	++
KWS Mistral*	2015	m	-	-	71	o	+	+	o	o	+	-	o	o	o

o = durchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

- = unterdurchschnittlich

\* = vorläufige Beurteilung

**LSV Sommerweizen 2014 - 2016 – Qualitätsmerkmale**

Merkmal	Rohprotein [%]			Fallzahl [sek.]			Hektolitergewicht [kg]		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Jahr</b>									
<b>Zahl Vers.</b>	7	5	4	5	3	1	8	8	6
<b>E Sonett</b>	13,2	13,8	14,4	310	252	191	73,8	75,0	73,1
Granus	12,9	12,9	14,6	296	188	–	75,1	75,5	75,3
<b>A Tybalt</b>	12,5	13,3	13,8	414	335	258	71,1	72,2	70,4
Cornetto	12,9	12,8	14,1	436	324	254	75,4	75,7	74,0
KWS Chamsin	13,4	14,0	15,0	376	273	331	77,0	76,7	75,6
Quintus	12,8	13,0	13,9	335	254	236	75,7	76,2	74,3
Licamero	–	13,7	15,1	–	241	283	–	76,5	76,1
KWS Mistral	–	–	15,3	–	–	267	–	–	76,9
<b>Mittel</b>	<b>12,9</b>	<b>13,4</b>	<b>14,5</b>	<b>369</b>	<b>267</b>	<b>272</b>	<b>75,0</b>	<b>75,4</b>	<b>74,6</b>