

Tab. 3: Wirkungsspektrum und Anwendungsbedingungen bei Grünlandherbiziden

Mittel Zulassung bis ...	Wirkstoff g/l/kg	max. zugelassene Aufwandmenge kg;l/ha bzw. g;mg/l	Anwendungszeitraum	Ampfer, Stumpfbl.-	Ackerkratzdistel	Brennessel	Binsen	Bärenklau	Duwock / Sumpfschachtelhalm	Gänsefuß- / Melde-Arten	Giersch	Hahnenfuß	Hellerkraut	Hirtentäschelkraut	Knöterich-Arten	Löwenzahn	Schafgarbe	Vogelmiere	Wegerich-Arten	Wiesenkerbel	Wartezeit in Tagen	Gewässer- abstand*	Abstand von Saum- struktur mit > 3 m Breite	Kosten (Herbst 2017) €/ha
U 46 D-Fluid*** Lotus 2,4 D Salvo Plus 10/2017	2,4-D 500 g/l	2,0 l/ha	Vegetation	-	xx	-	++	-		xxx	-	x	xxx	xx	x	xx(x)	x	-	xx	-	28	1 m	--	20
U 46 D-Fluid Lotus 2,4 D Salvo Plus 12/2031	2,4 D-Fluid	1,5 l/ha	März - Okt.	Spitzwegerich (XX) NW800: keine Anwendung auf gedrahten Flächen zwischen dem 01.11 und dem 15.03.																	14	10 m oder 1 m/90 %	NT 103	14
U 46 M-Fluid Dicopur M Lotus MCPA MCPA 500 10/2018	MCPA 500 g/l	2,0 l/ha	Mai - August	-	xx	-	++(+)	-	xx	xxx	-	xx	xxx	xx	-	xx	-	-	xxx	-	14	1 m	NT 109	17
U 46 M-Fluid*** Dicopur M CERIDOR - MCPA MCPA 500 Profi MCPA 05/2017	MCPA 500 g/l	2,0 l/ha	Mai - August	-	xx	-	++(+)	-	xx	xxx	-	xx	xxx	xx	-	xx	-	-	xxx	-	28	1 m	NT 108	17
Banvel M*** 12/2017	Dicamba 30 g/l MCPA 340 g/l	6,0 l/ha	April - September	xx	xx	x(x) +(+) 2)	x(x)	-	xx	xx(x)	(x)	xxx	x(x)	xx	x(x)	xxx	xx	xxx	xx	x	14	5 m oder 1 m / 50 %	NT 103	95
Harmony SX⁴ 06/2018	Thifensulfuron 480,6 g/l	45 g/ha	Vegetation	xxx	(+)	+	-	(+)	-	-	-	+		++	(+)	+	++	++	-	-	14	5 m oder 1 m/ 75%	NT 103	67

* Generell gilt: Von allen Gräben, ob mit oder ohne Wasser, ist in Niedersachsen 1 m Sicherheitsabstand einzuhalten! Die weitergehenden Gewässerabstandsauflagen gelten im Regelfall nicht für gelegentlich wasserführende Gräben.

x = Wirkungsbeurteilung für zugelassene Indikation
 += Wirkungsbeurteilung für zurzeit nicht zugelassene Indikation
 xxx bzw. +++ = durchschlagende Wirkung (mit Reserven)
 xx bzw. ++ = gute Wirkung
 x bzw. + = befriedigende Wirkung
 () = Einschränkung

- = keine Wirkung; kein Eintrag = keine Bewertung

NT 101 = 20 m mit 50 % Abdriftminderung

NT 103 = 20 m mit 90 % Abdriftminderung

NT 108 = 5 m Abstand + 20 m mit 75 % Abdriftminderung

NT 109 = 5 m Abstand + 20 m mit 90 % Abdriftminderung

- Das Mittel hat zurzeit keine Indikationszulassung gg. die Große Brennessel
- Die Indikationszulassung besteht gegen die Große Brennessel
- Anwendung nicht im Ansaatjahr; Weidelgrasreiche Bestände nur im Herbst behandeln

** F = Wartezeit durch Anwendungszeitpunkt unbedeutend
 F gilt bei Flächenbehandlung; 28 Tage bei Einzelpflanzen-
 behandlung

***Aufbrauchfrist: Banvel M: 30.06.2019
 U 46 D: 30.04.2019
 U 46 M: 30.11.2018
 Taipan: 31.05.2019

Tab. 3 Forts.: Wirkungsspektrum und Anwendungsbedingungen bei Grünlandherbiziden

Mittel Zulassung bis ...	Wirkstoff g/l/kg	max. zugelassene Aufwandmenge kg/l/ha bzw. g/mg/l	Anwendungszeitraum	Ampfer, Stumpfbl.-	Ackerkratzdistel	Brennessel	Binsen	Bärenklau	Duwock / Sumpfschachtelhalm	Gänsefuß- / Melde-Arten	Giersch	Hahnenfuß	Hellerkraut	Hirtentäschelkraut	Knöterich-Arten	Löwenzahn	Schafgarbe	Vogelmiere	Wegerich-Arten	Wiesenkerbel	Warte- zeit in Tagen	Gewässer- abstand	Abstand von Saum- struktur mit > 3 m Breite	Kosten (Herbst 2017) €/ha
Taipan*** 06/2017	Fluroxypyr 200 g/l	1,8 l/ha	Mai - August	xx(x)	(+)	++	-	+	-	-	-	-	+(+)	+(+)	+(+)	+++	+	+++	+	-	21	5 m oder 1 m / 50 %	NT 108	28
Ranger 12/2021	Fluroxypyr 150 g/l Triclopyr 150 g/l	2,0 l/ha	Vegetation	xx(x)	-	xxx ³⁾	+	++	-	+	+(+)	+	++(+)	++	++	xxx	+	+++	++	(+)	14	5 m oder 1 m / 90%	NT 103	88
Simplex 12/2025	Fluroxypyr 100 g/l Aminopyralid 30 g/l	2,0 l/ha	Vegetation	xxx	xxx	xxx	(x)	(x)	(x)	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	7	10 m oder 1 m/90%	NT 103	108

** Generell gilt: Von allen Gräben, ob mit oder ohne Wasser, ist in Niedersachsen 1 m Sicherheitsabstand einzuhalten! Die weitergehenden Gewässerabstandsauflagen gelten im Regelfall nicht für gelegentlich wasserführende Gräben.

x = Wirkungsbeurteilung für zugelassene Indikation
+ = Wirkungsbeurteilung für zurzeit nicht zugelassene Indikation
xxx bzw. +++ = durchschlagende Wirkung (mit Reserven)
xx bzw. ++ = gute Wirkung
x bzw. + = befriedigende Wirkung
() = Einschränkung

- = keine Wirkung; kein Eintrag = keine Bewertung

NT 101 = 20 m mit 50 % Abdriftminderung

NT 103 = 20 m mit 90 % Abdriftminderung

NT 108 = 5 m Abstand + 20 m mit 75 % Abdriftminderung

NT 109 = 5 m Abstand + 20 m mit 90 % Abdriftminderung

- 2) Das Mittel hat zurzeit keine Indikationszulassung gg. die Große Brennessel
- 3) Die Indikationszulassung besteht gegen die Große Brennessel
- 4) Anwendung nicht im Ansaatjahr; Weidelgrasreiche Bestände nur im Herbst behandeln

** F = Wartezeit durch Anwendungszeitpunkt unbedeutend
F gilt bei Flächenbehandlung; 28 Tage bei Einzelpflanzen-
behandlung

***Aufbrauchfrist: Banvel M: 30.06.2019
U 46 D: 30.04.2019
U 46 M: 30.11.2018
Taipan: 31.05.2019

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen ist die aktuelle Zulassungssituation und die Gebrauchsanleitung genau zu beachten.