

Durchschnittliche N_{min}-Richtwerte - 5jähriges Mittel

Stand September 2018

Boden-Klima-Raum	Bodenschicht	Raps gesamt kg N _{min} /ha 2014-2018	Stoppel- weizen kg N _{min} /ha 2014-2018	Rüben- weizen kg N _{min} /ha 2014-2018	Winter- weizen (Blattvor- frucht RAW, K, M) kg N _{min} /ha 2014-2018	Winter- gerste, -Roggen, -Triticale kg N _{min} /ha 2014-2018	Sommer- getreide kg N _{min} /ha 0-90 2014-2018*	Kartoffeln kg N _{min} /ha 0-90 2014-2018*	Zucker- rüben kg N _{min} /ha 2014-2018	Mais kg N _{min} /ha 0-90 cm 2014-2018*	Gemüse kg N _{min} /ha
9; 46; 51 sandige Böden	0-30 cm	11	10	14	13	10	12	15	16	16	14
	30-60 cm	9	7	11	12	7	9	11	10	11	9
	60-90 cm	9	14	12	15	10	10	12	11	11	-
	Gesamt	29	31	37	40	27	31	38	37	38	23
48; 50 sandige Böden	0-30 cm	9	10	-	9	10	17	17	10	13	-
	30-60 cm	9	13	-	8	10	13	11	11	10	-
	60-90 cm	13	23	-	14	15	14	13	13	10	-
	Gesamt	31	46	-	31	35	44	41	34	33	-
45; 47 Lehmböden, leichte Lehmböden	0-30 cm	14	14	21	15	11	19	18	24	20	22
	30-60 cm	12	18	21	19	10	15	11	23	16	21
	60-90 cm	10	18	13	26	12	16	12	15	12	-
	Gesamt	36	50	55	60	33	50	41	62	48	43 (2 Jahre)
11, 34, 45 Hügelland schwere Lehmböden	0-30 cm	13	12	17	16	12	-	-	22	19	-
	30-60 cm	12	18	17	21	14	-	-	18	18	-
	60-90 cm	11	21	12	21	14	-	-	14	17	-
	Gesamt	36	51	46	58	40	-	-	54	54	-
52 Marschen Tonböden	0-30 cm	13	13	18	16	15	18	20	10	19	-
	30-60 cm	14	17	17	21	17	14	16	15	21	-
	60-90 cm	12	16	19	20	17	14	16	16	18	-
	Gesamt	39	46	54	57	49	46	52	41	58	-

* Nmin-Richtwerte für Sommergetreide, Kartoffeln und Mais sind auf 90 cm extrapoliert.

Da in diesen Kulturen bis 2017 nur bis 60 cm beprobt wurde, liegen für die Schicht 60-90 cm keine langjährigen Messwerte vor.