

Ertragsergebnisse im Vergleich: Luzerne, Rotklee, Luzernegras, Rotklee gras (Mittelwert aus Erntejahren 2013 und 2014 von den niedersächsischen Standorten Otterham [LK Aurich], Wehnen [LK Ammerland] und Dasselsbruch [LK Celle])




Tabelle 1: Kleegrasmischungen zur Saat im August (Auszug aus Qualitäts-Standardmischungen für den Hauptfruchtfeldfutterbau 2018/19)

Standardmischung	Klee gras				
	über- bis mehrjährig				
	A 3 plus W	A 3 plus S	A 5 spät plus W	A 5 spät plus S	A 7
Nutzungsdauer	1-2 Haupt-nutzungsjahre und mehr	1-2 Haupt-nutzungsjahre und mehr	2 Haupt-nutzungsjahre und mehr	2 Haupt-nutzungsjahre und mehr	2 Haupt-nutzungsjahre und mehr
Nutzungsformen	Weide und Schnitt	Schnitt	Weide und Schnitt	Schnitt und Weide	Schnitt und Weide
Aussaats	August Blanksaat oder Frühjahr unter Deckfrucht	August Blanksaat oder Frühjahr unter Deckfrucht	August Blanksaat oder Frühjahr unter Deckfrucht	August Blanksaat oder Frühjahr unter Deckfrucht	August Blanksaat oder Frühjahr unter Deckfrucht
	%	%	%	%	%
Welsches Weidelgras	21	21			
Bastardweidelgras	21	21			
Deutsches Weidelgras	29	29			17
früh					
mittelfrüh			33	33	
spät			34	34	
Wiesenschwingel					33
Wiesenlieschgras					17
Luzerne					
Rotklee	17	29	20	33	20
Weißklee	12		13		13
Saatstärke bei Blanksaat: kg/ha***	35	35	30	30	30
Saatstärke bei Untersaat: kg/ha***	25	25	25	25	25

*** = Je nach Anteil tetraploider Sorten kann die Aussaatstärke um bis zu 30 % erhöht werden

*****= mindestens 2 Sorten