

vorläufige Ergebnisse LSV Sommer-Futtergerste 2017 - 2020 - **Relativerträge - Sorten - Jahre (behandelte Stufe)**

Standortgruppe		Sand- und Lehmlandorte Nordwest					
Jahr		2017	2018	2019	2020	mehrj. Ergebnisse 2016 - 2020¹⁾ LSV + WP Ergebnisse	
Zahl Versuche		5	8	9	8	rel.	Anz. Vers.
Sorte	Züchter						
RGT Planet	* RAGT	104	103	104	103	101,1	50
KWS Beckie	* KWS Getreide	-	99	100	94	96,7	30
Klarinette	* Secobra	-	-	97	99	97,8	21
Applaus	* Nordsaat/SU	-	-	-	103	103,5	10
Standard dt/ha		79,2	56,6	63,8	66,0	66,7	

* = Sorten des Standardmittels 2020

¹⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP-Ergebnisse

vorläufige Ergebnisse LSV Sommer-Futtergerste 2020 – **Eigenschaften**

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche bundesweit (Angaben in ha)			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Marktware > 2.2 mm	Rohprotein-gehalt (+=hoch)	Halm-länge (+=kurz)	Festigkeit gegen							
			2018	2019	2020							Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Zwergrost	Netzflecken	Ramularia
RGT Planet	2014	m	2.245	2.501	2.230	+	o	+	+	--	o	o	o	+	++	+	+	o	o
KWS Beckie	2017	m	35	14	12	+	o	+	+	--	++	+	+	+	++	o	-	o	o
Klarinette	2018	m	-	20	22	++	+	o	+	--	+	+	+	o	++	+	+	+	+
Applaus*	2019	m	-	-	92	++	+	o	+	--	+	o	o	+	++	-	o	o	/

o = durchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

-- = unterdurchschnittlich

m = mittel

msp = mittelspät

*=vorläufige Beurteilung

/ = keine Einstufung