

LSV Sommerweizen 2017 - 2020 - Relativerträge (behandelte Stufe) - Sorten - Jahre

Standortgruppe	Marschstandorte					Lehmige Standorte Nordwest								
	2017	2018	2019	2020	mehrj. Ergebnisse 2016 - 2020 <sup>1)</sup> LSV + WP Ergebnisse	2017	2018	2019	2020	mehrj. Ergebnisse 2016 - 2020 <sup>1)</sup> LSV + WP Ergebnisse				
Jahr					rel.	Anz. Vers.					rel.	Anz. Vers.		
Zahl der Versuche**	3	2	3	2			5	7	9	4				
Sorte	Züchter													
A KWS Mistral	* KWS Getreide		100	104	97	102	<b>100,5</b>	12	104	103	106	98	<b>100,3</b>	28
A Licamero	* Secobra/ BayWa		100	100	103	98	<b>99,6</b>	12	103	101	105	107	<b>102,2</b>	28
A Quintus	* Eckendorf/SU		105	103	104	106	<b>103,5</b>	12	102	98	95	98	<b>97,5</b>	36
A Servus	Strube/Hauptsaaen		107	99	94	102	<b>100,5</b>	10	105	101	95	99 <sup>3</sup>	<b>99,4</b>	25
A Jasmund	* Strube/IG Pfl.Zucht		–	101	99	97	<b>99,8</b>	7	–	102	102	98	<b>100,7</b>	23
E SU Ahab	* Strube/SU		–	–	98	95	<b>95,8</b>	5	–	–	96	93	<b>96,2</b>	22
A KWS Starlight	* KWS Getreide		–	–	105	106	<b>105,1</b>	5	–	–	101	107	<b>101,3</b>	20
A Akvitan	* DSV		–	–	–	96	<b>95,6</b>	2	–	–	–	99	<b>101,8</b>	12
E Zenon	Secobra/ LG		103	102	101	98	<b>100,0</b>	10	96	99	91	–	–	–
E Anabel	IG Pflanzenzucht		95	97	–	–	–	–	103	98	104	95	<b>98,0</b>	25
<b>Standard dt/ha</b>	<b>81,4</b>	<b>80,6</b>	<b>64,6</b>	<b>86,6</b>	<b>79,4</b>			<b>65,2</b>	<b>69,8</b>	<b>64,4</b>	<b>70,8</b>	<b>73,3</b>		

\* = Varianten des Standardmittels

\*\* = bei Abweichung ist die Zahl der Versuche direkt angegeben, z.B. 99<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> = Werte werden nach der Hohenheim-Güzlöwer-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP-Ergebnisse

**LSV Sommerweizen 2017 - 2020 – Qualitätsmerkmale**

Merkmal	Rohprotein [%]				Fallzahl [sek.]				Hektolitergewicht [kg]			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
<b>Zahl Vers.</b>	3	7	8	7	4	6	6	5	8	8	10	5
A KWS Mistral	14,9	13,3	13,7	12,9	278	356	280	368	75,5	81,1	76,9	80,4
A Licamero	14,6	13,1	13,2	12,8	250	354	337	343	73,8	80,1	75,9	76,7
A Quintus	14,1	12,3	13,4	12,0	238	326	274	317	73,7	78,6	74,0	76,7
A Servus	14,4	12,7	14,2	12,5	381	379	370	362	71,6	76,6	70,8	77,4
A Jasmund	–	12,6	13,6	12,6	–	352	318	354	–	78,8	72,8	76,7
A KWS Starlight	–	–	13,3	12,0	–	–	311	344	–	–	74,6	76,3
A Akvitan	–	–	–	12,8	–	–	–	281	–	–	–	76,1
E Zenon	15,1	13,3	14,2	12,9	349	397	368	287	72,0	77,4	73,2	76,3
E Anabel	14,2	12,6	12,7	11,6	288	383	369	349	75,2	80,7	76,4	80,5
E SU Ahab	–	–	13,9	12,9	–	–	313	362	–	–	74,6	74,6
<b>Mittel</b>	<b>14,7</b>	<b>12,9</b>	<b>13,5</b>	<b>12,5</b>	<b>289</b>	<b>366</b>	<b>329</b>	<b>337</b>	<b>73,8</b>	<b>79,2</b>	<b>75,0</b>	<b>77,2</b>

## LSV Sommerweizen 2020 - Eigenschaften und Empfehlungen 2021

Quelle: Alle Versuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt

Sorte	Qualitätsgruppe	im Handel seit	Vermehrungsfläche in D (ha) 2020 (vorl.)	Anbauempfehlung für Anbauregion		Qualitäten			Festigkeit gegen					
				Marsch	Lehme Nordwest	Rohprotein-gehalt	Fallzahl	Hektoliter-gew.	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Braunrost	Gelbrost	Ährenfusarium
KWS Mistral	A	2015	15	X	X	++	+	++	o	+	-	o	o	o
Licamero <sup>+</sup>	A	2015	123	X	X	+	+	+	o	+	o	-	+	+
Quintus <sup>1)</sup>	A	2013	387	X	(X)	o	o	o	o	-	+	+	++	++
Servus	A	2016	362	X		+	++	-	+	++	+	-	o	-
Jasmund	A	2017	8	X	X	o	+	o	+	+	o	o	o	o
SU Ahab	E	2019	40			+	+	o	+	o	o	+	o	o
KWS Starlight <sup>2)</sup>	A	2018	40	X	X	o	+	o	o	-	+	+	+	+
Akvitan <sup>*</sup>	A	2019	1			+	o	o	o	+	o	+	o	o
Zenon	E	2016	8	X		++	++	-	+	+	+	+	+	+
Anabel	E	EU	23			o	++	++	o	++	o	o	++	/

o = durchschnittlich, + = überdurchschnittlich, - = unterdurchschnittlich

\* = vorläufige Beurteilung

/ = keine Beurteilung

<sup>1)</sup> = begrannt, <sup>+</sup> = Sorte wurde auch mehrjährig für Spätsaaten im Herbst getestet <sup>2)</sup> = Resistenz gegen Orangerote Weizengallmücke

X = generelle Empfehlung; (X) = eingeschränkte Empfehlung auf Grund schwächerer Erträge, aber guter Festigkeit gegenüber Rosten und Ährenfusarium

## Anbauzahlen Sommerweizen in Niedersachsen

Jahre	Anbaufläche in ha	% der Ackerfläche	Ertrag dt/ha
2009	5.493	0,3	52,1
2010	4.260	0,2	46,8
2011	7.620	0,4	55,3
2012	53.827	2,9	66,6
2013	6.890	0,4	55,9
2014	4.780	0,3	55,6
2015	5.600	0,3	59,5
2016	6.600	0,4	55,6
2017	5.400	0,3	55,9
2018	23.000	1,2	53,1
2019	3.900	0,2	47,2
2020*	5.300	0,3	54,3

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

\*vorläufige Zahlen des LSN vom 19.08.2020