


Goldenstedt 2020




Borwede 16.06.2020

Krautfäuleversuch LWK



Fungizidempfehlungen, Krautfäule



	Spritzstart (1 – 2 x)	Folgespritzungen vor d. Blüte	Folgespritzungen nach d. Blüte	Abschluss- spritzung
hoch	Stängelphytophthora: Kombination aus systemisch (Propamocarb) + teil-systemisch (möglichst cymoxanilhaltig) + Sporizid (Shirlan, RanmanTop) z.B.: Proxanil + Ranman Top Oder Infinito + Cymbal flow + Shirlan Oder Zorvec Enicade + Manzate Oder Zorvec Endavia		Kombination aus teil-systemisch (cymoxanilhaltig) + Sporizid (Shirlan u.a., RanmanTop) z.B.: Carial Flex, Tanos, Curzate M jew. +Sporizid Plexus, Cymbal flow + Shirlan	Sporizide: Ranman Top Shirlan, Nando, Banjo, Terminus, Winby Carneol
Infektionsdruck	Proxanil + Winby, Rival Duo + Carneol Infinito, Carial Flex, Ridomil Gold MZ 1x	Teilsystemische Fungizide: Acrobat Plus, Areva MZ, Banjo forte, Carial Flex, Cymbal flow + Shirlan, Curzate M WG, Fantic M, Nautil WP, Plexus, Presidium, Revus, Shaktis, Tanos, Valbon, Valis M,	Teilsystemische Fungizide oder Sporizid Revus, Banjo forte, Cymbal flow + Shirlan, Ranman Top, Shirlan, Ohayo, Carneol, Terminus, Nando, Shaktis, Electis,	
gering	Ridomil Gold MZ 1x Fantic M WG	Kontaktsporizide: Ranman Top, Shirlan, Nando, Carneol, Shaktis, Electis	Kontaktfungizide: Canvas/Gachinko, Dithane NeoTec, Tridex DG, Manzate o.a.	
	6– 10Tage	6 – 10 Tage	7 – 10 Tage	7 –14 Tage