

**Tabelle 1: Inhaltsstoffe<sup>1)</sup> und Bonituren langjährig durchgeführter Nachsaatvarianten, 1. Aufwuchs 2007**

(Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Dasselsbruch 1999 - 2007)

Varianten	Merkmale % i. T.	Rohfaser % i. T.	Rohprotein % i. T.	Asche % i. T.	MJ NEL je kg TM	Narbendichte <sup>2)</sup>	
						Frühjahr	Herbst
Altnarbe		<b>28,7</b>	<b>15,2</b>	<b>9,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>
Frühjahrsnachsaaten		<b>26,0</b>	<b>16,0</b>	<b>8,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>
Herbstnachsaaten		<b>26,3</b>	<b>16,2</b>	<b>8,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>
Übersaatvarianten		<b>25,6</b>	<b>16,1</b>	<b>8,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>
Schlitzsaatvarianten		<b>27,1</b>	<b>16,3</b>	<b>8,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>
Frässaatvarianten		<b>25,5</b>	<b>16,2</b>	<b>8,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>
Neuansaat (2000)		<b>24,5</b>	<b>17,7</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>
mit Weißklee		<b>26,3</b>	<b>15,6</b>	<b>8,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>
ohne Weißklee		<b>26,0</b>	<b>16,5</b>	<b>8,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>

<sup>1)</sup> NIRS-Verfahren

<sup>2)</sup> 1 = gering 5= mittel 9= stark