

Anbauzahlen Wintertriticale 2009 - 2018

Jahre	Anbauflächen (ha)	% der Ackerfläche	Ertrag dt/ha
2009	77.695	4,1	68
2010	78.985	4,2	58,2
2011	66.703	3,6	58,3
2012	66.519	3,5	71,3
2013	76.952	4,3	70,6
2014	79.237	4,2	74,6
2015	82.800	4,4	71,5
2016	81.300	4,2	66,2
2017	78.100	4,1	63,0
2018*	66.300	3,6	55,4

*= vorläufig

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

LSV Triticale 2016 - 2018 – Relativerträge*

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe		Sandböden West					Sandböden Nord						
		Jahres-Ergebnis LSV				mehrij. Ergebnisse 2015 - 2018 ¹⁾	Jahres-Ergebnis LSV				mehrij. Ergebnisse 2015 - 2018 ¹⁾		
Jahr		2016	2017	2018	Minder- ertrag ¹⁾		rel.	Anz. Vers.	2016	2017		2018	Minder- ertrag ¹⁾
Zahl Versuche**		4	4	4					4	4	4		
Sorte	Züchter												
Lombardo	Syngenta	103	100	104	-14	101	16	102	102	100	-3	103	15
Barolo	Syngenta	107	101	93	-13	99	16	104	99	96	-14	97	16
Cedrico	Syngenta	100	103	100	-12	100	12	104	103	99	-10	102	12
Temuco	Syngenta	-	99	99	-9	99	8	-	97	102	-8	101	9
Robinson	Franck/IG	-	96	98	-12	96	8	-	99	95	-10	97	9
Lanetto	Syngenta	-	-	106	-12	-	-	-	-	103	-11	102	6
Porto	Danko	-	-	100	-8	-	-	-	-	102	-9	99	6
Riparo	ISZ/Secobra	-	-	100	-6	-	-	-	-	102	-14	99	6
Tantris	Franck/IG	-	103 ¹⁾	96	-17	98	5	-	-	-	-	-	-
Standard dt/ha		93	95	81		92		92	88	69		85	

*= Erträge ausschließlich aus behandelten Stufen ** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 1084 1) = Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe

LSV Triticale 2016 - 2018 – Relativerträge*

Sorten - Jahre - Standortgruppen

Standortgruppe		Lehme West					Höhenlagen Mitte/West						
		Jahres-Ergebnis LSV				mehrij. Ergebnisse 2015 - 2018 ¹⁾	Jahres-Ergebnis LSV				mehrij. Ergebnisse 2015 - 2018 ¹⁾		
Jahr		2016	2017	2018	Minder- ertrag ¹⁾		rel.	Anz. Vers.	2016	2017		2018	Minder- ertrag ¹⁾
Zahl Versuche**		5	5	5					3	3	3		
Sorte	Züchter												
Lombardo	Syngenta	108	102	105	-18	102	20	105	99	103	-9	100	12
Barolo	Syngenta	101	99	99	-17	98	23	103	99	100	-9	99	12
Cedrico	Syngenta	99	103	93	-13	97	17	107	101	96	-6	101	10
Tantris	Franck/IG	99	99	96	-19	98	18	100	99	95	-11	98	12
Temuco	Syngenta	-	97	100	-10	98	16	-	98	100	-8	100	7
Robinson	Franck/IG	-	100	97	-16	99	16	-	102	97	-7	98	7
Lanetto	Syngenta	-	-	103	-19	104	11	-	-	98	-7	-	-
Porto	Danko	-	-	102	-11	101	11	-	-	101	-9	-	-
Riparo	ISZ/Secobra	-	-	101	-14	101	11	-	-	104	-10	-	-
Standard dt/ha		93	99	92		96		113	105	91		104	

* = Erträge ausschließlich aus behandelten Stufen ** = bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z. B. 1084 1) = Minderertrag der unbehandelten gegenüber der behandelten Stufe

LSV Triticale 2018 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha)			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Halm-länge (+=kurz)	RP-gehalt	Festigkeit gegen ³⁾					Aus-winterung ²⁾
			2016	2017	2018**						Lager	Blatt-septoria	Braun-rost	Mehl-tau	Gelb-rost	
			Lombardo	2015	m						331	606	823	o	o	
Barolo	2015	m	285	673	606	o	+	o	++	o	+	+	+	o	o	+
Cedrico	2016	m	-	29	69	+	+	o	o	o	+	+	+	o	o	1)
Temuco	2017	m	-	-	-	o	++	o	o	-	+	o	++	+	o	1)
Robinson	2017	m	-	22	68	-	o	++	-	+	o	o	o	+	o	1)
Lanetto	2018	m	-	-	-	-	+	+	o	-	o	-	-	++	o	1)
Porto	2018	m	-	-	13	o	o	+	+	+	-	+	++	++	++	1)
Riparo	2018	m	-	-	20	+	-	++	o	o	o	+	++	o	+	1)
Tantris	2014	m	162	273	155	+	o	+	+	+	+	o	o	-	o	o

** = vorläufige Angaben 1) = bisher nicht ermittelt oder eingestuft

o = durchschnittlich

- = unterdurchschnittlich

+ = überdurchschnittlich

2) = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten mitberücksichtigt

* = vorläufige Beurteilung

LSV Triticale 2018 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha)			Ähren je m ²	Körner je Ähre	TKG	Halm-länge (+=kurz)	RP-gehalt	Festigkeit gegen ³⁾					Aus-winterung ²⁾
			2016	2017	2018**						Lager	Blatt-septoria	Braun-rost	Mehl-tau	Gelb-rost	
Lombardo	2015	m	331	606	823	o	o	+	o	o	o	+	-	o	o	++
Barolo	2015	m	285	673	606	o	+	o	++	o	+	+	+	o	o	+
Cedrico	2016	m	-	29	69	+	+	o	o	o	+	+	+	o	o	1)
Temuco	2017	m	-	-	-	o	++	o	o	-	+	o	++	+	o	1)
Robinson	2017	m	-	22	68	-	o	++	-	+	o	o	o	+	o	1)
Lanetto	2018	m	-	-	-	-	+	+	o	-	o	-	-	++	o	1)
Porto	2018	m	-	-	13	o	o	+	+	+	-	+	++	++	++	1)
Riparo	2018	m	-	-	20	+	-	++	o	o	o	+	++	o	+	1)
Tantris	2014	m	162	273	155	+	o	+	+	+	+	o	o	-	o	o

** = vorläufige Angaben 1) = bisher nicht ermittelt oder eingestuft

o = durchschnittlich - = unterdurchschnittlich + = überdurchschnittlich

2) = Bonituren der LFA aus MV bei dort geprüften Sorten mitberücksichtigt

* = vorläufige Beurteilung

LSV Triticale 2016 - 2018 – Qualitätsmerkmale

Mittel der behandelten Stufe

Merkmal	Rohprotein %			hl-Gewicht
	2016	2017	2018	2018
Sorte				
Lombardo	12,2	12,3	12,6	74,0
Barolo	12,3	12,2	12,7	74,6
Cedrico	12,5	12,4	13,0	77,4
Temuco	–	12,4	12,3	73,8
Robinson	–	12,8	13,3	76,0
Lanetto	–	–	12,3	77,0
Porto	–	–	13,0	79,0
Riparo	–	–	12,6	74,9
Tantris	12,9	12,9	13,5	76,2
Mittel Versuch	12,7	12,5	12,8	75,9
Anzahl Orte	10	10	10	15