

### Anbaufläche Sommergerste in Niedersachsen

Jahre	Anbaufläche Sommergerste in ha	% der Ackerfläche	Ertrag dt/ha
2009	45.396	2,4	51,8
2010	32.519	1,7	44,4
2011	44.077	2,3	50,2
2012	67.140	3,6	59,0
2013	42.436	2,3	58,9
2014	38.068	2,0	61,4
2015	44.900	2,4	59,0
2016	49.800	2,7	57,0
2017	45.900	2,4	54,0
2018*	85.000	4,6	51,4

\* = vorläufige Ergebnisse des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN)

## Ergebnisse LSV Sommer-Futtergerste 2014 - 2018

### Relativerträge - Sorten - Jahre (behandelte Stufe)

Standortgruppe		Sand- und Lehmstandorte Nordwest					mehrij. Ergebnisse 2014-2018 <sup>2)</sup> LSV + WP Ergebnisse	
Jahr		2014	2015	2016	2017	2018	rel.	Anz. Vers.
Zahl Versuche <sup>1)</sup>		8	6	5	5	8		
Sorte	Züchter							
Salome	* Nordsaat/SU	101	102	101	98	98	<b>99</b>	33
Vespa	* Limagrain	102	98	100	99	102	<b>100</b>	33
Sydney	* Streng/IG	101	101	100	100	100	<b>100</b>	33
KWS Dante	* KWS Getreide	101	100	103	101	99	<b>100</b>	33
RGT Planet	* RAGT	-	-	103	104	103	<b>103</b>	36
KWS Beckie	* KWS Getreide	-	-	-	-	99	<b>99</b>	13
RGT Atmosphere	* RAGT	-	-	-	-	98	<b>98</b>	13
Subway	* Nordic Seed	-	-	-	-	100	<b>100</b>	13
Laureate	Syngenta	-	-	-	-	101 <sup>5)</sup>	<b>101</b>	15
<b>Standard dt/ha</b>		<b>86,2</b>	<b>78,2</b>	<b>68,6</b>	<b>79,2</b>	<b>56,6</b>	<b>73,2</b>	

\* =Sorten des Standardmittels

<sup>1)</sup> =bei Abweichung ist die Zahl direkt angegeben, z.B. 102 <sup>5)</sup>

<sup>2)</sup> = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z.T. auch WP-Ergebnisse

Ergebnisse LSV Sommer-Futtergerste und Empfehlungen für den Anbau 2019

Sorte	im Handel seit	Vermehrungsfläche 2018 in D	Anbauempfehlung für Anbauregion	Ertragsleistung	Qualitäten				Festigkeit gegen						
					TKG	Marktware > 2.2 mm	Rohprotein-gehalt (+=hoch)	Hektoliter-gew.	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Zwergrost	Netzflecken
<b>drei- und mehrjährig geprüfte Sorten</b>															
Salome	2011	110		o	o	+	--	+	o	o	-	++	o	o	+
Vespa	2012	113	(X)	o	+	+	--	+	o	+	o	++	o	-	o
Sydney	2013	64	(X)	o	o	+	--	+	o	+	-	++	o	+	o
KWS Dante	2013	24	(X)	o	o	+	--	+	+	+	+	++	o	o	o
RGT Planet	2014	2.245	X	+	+	+	--	o	+	+	o	++	+	+	+
<b>einjährig geprüfte Sorten</b>															
KWS Beckie*	2017	35		o	+	+	--	o	+	+	+	++	o	-	o
RGT Atmosphere*	2017	0		o	++	+	--	+	+	o	o	++	+	+	o
Subway*	2017	18		o	+	+	--	o	+	o	o	++	o	o	o
Laureate*	2016	236		o	+	+	--	o	o	+	+	++	+	+	+

o = durchschnittlich      + = überdurchschnittlich      - = unterdurchschnittlich      \* = vorläufige Beurteilung  
X = generelle Empfehlung, (X) = eingeschränkte Empfehlung