

Sortenversuch Winter-Braugerste – Ertrag 2017 - 2020 – Eigenschaften 2020

Merkmal		Kornertrag dt/ha, rel.					Qualitäten behandelte Stufe				Pflanzen- länge	Lager- neigung	Anfälligkeit gegen	
		Roh- protein	hl- Gew.	Voll- gerste	Sort. > 2,8 mm	Halm- knicken	Ähren- knicken							
Orte		Mittel der Orte (Hamerstorf, Wohlde, Wulfsode, Rosenthal)					Mittel der Orte, Absolutwerte bzw. Boniturwerte (1 - 9) (1 = gering; 5 = mittel; 9 = stark)							
Jahr	Züchter/ Vertrieb	2017	2018	2019	2020	2017-20	2020							
Faktor 1: Sorte							%	kg	%	%	cm	Bonituren		
KWS Liga (B)	KWS Lochow	104	101	100	98	101	10,5	65,1	98,9	69,0	82	Lager trat 2020 nicht auf	2,3	3,8
KWS Somerset (B)	KWS Lochow	-	-	-	102	(102)	10,2	65,0	98,9	80,0	83		2,1	3,8
KWS Faro (mz)	KWS Lochow	-	-	115	97	(108)	10,2	66,6	99,2	70,0	85		2,7	3,8
Quadriga (Fu.)	Secobra	117	108	117	106	112	9,9	64,1	98,5	76,0	93		2,4	4,2
Wintmalt (B)	KWS Lochow	98	97	100	-	(98)	-	-	-	-	-		-	-
KWS Joy	KWS Lochow	102	103	-	-	(102)	-	-	-	-	-		-	-
Mittel		103	103	108	101	104	10,2	65,2	98,9	73,8	85,8	-	2,4	3,9
Standard		78	69	73	55	70	10,4	65,1	98,9	74,5	82,5	-	2,2	3,8
Anzahl Orte		4	3	4	3	14	3	3	2	2	3		3	3

Bezugssorten: (Wintmalt (2017 - 2019), KWS Liga (2017 - 2020), KWS Somerset (2020); Intensität (Braugerstendüngung)

(Fu.) = Futtergerstensorte

(mz) = mehrzeilig

() = Mittelwerte nicht orthogonal, da hier nicht direkt vergleichbar mit durchgängig geprüften Sorten