

Standort (Vers. Nr.)	BKR	Ernte-N _{min}				Boden- art	Standort- spezi- fische Feld- kapazität (9 dm)	Datum BOWAB	Aktueller Bodenwasser- gehalt	Beginn der Sickerwasser- bildung am	Angefallene Sickerwasser- menge	Fehlende Wasser- menge bis Feld- kapazität
		Kultur	N-Düngung Bzw. Versuchs- variante	N _{min} 0-90 cm [kg/ha]	Datum							
Hamerstorf (643)	46	Mais (konv)	N-Bedarfswert – 20 %	-	-	Su2	188 mm	25.10.20	136 mm	-	-	52 mm
Thülsfelde (644)	50	Mais	N-Bedarfswert	36	22.09.20	fS	156 mm	24.10.20	118 mm	-	-	38 mm
Wehnen (645)	50	Winterroggen (Block 1)	N-Bedarfswert	19	06.08.20	fSms	147 mm	24.10.20	137 mm	-	-	10 mm
Wehnen (649)	50	Mais	240 kg N/ha	94	17.09.20	fSms	147 mm	24.10.20	142 mm	-	-	5 mm
Schickels- heim (491b)	45	Winterweizen	210 kg N/ha	18	03.08.20	Ut3	298 mm	25.10.20	193 mm	-	-	105 mm
Dinklage (BDF033-L)	47	Wintergerste	N-Bedarfswert	-	24.07.20	fSms	149 mm	25.10.20	141 mm	25.07.20	43 mm	8 mm
Glissen (BDF049-L)	46	Mais	N- Bedarfswert	-	24.09.20	fSms	148 mm	24.10.20	119 mm	-	-	29 mm
Meinersen (BDF056-L)	46	Mais	N-Bedarfswert	-	-	mSfs	134 mm	24.10.20	92 mm	-	-	42 mm
Hohen- zethen (BDF064-L)	9	Mais	N-Bedarfswert	-	-	Sl2	182 mm	-	-	-	-	-