

vorläufige Ergebnisse LSV Hafer 2018 - 2020: **Relativerträge - Sorten - Jahre - Standortgruppen (behandelte Stufe)**

Standortgruppe		Sandstandorte Nordwest					Marsch, lehmige Standorte Nordwest					
		2018	2019	2020	mehrj. Ergebnisse 2016 - 2020 ¹⁾ LSV + WP Ergebnisse		2018	2019	2020	mehrj. Ergebnisse 2016 - 2020 ¹⁾ LSV + WP Ergebnisse		
Jahr												
Zahl	Versuche	4	3	3	rel.	Anz. Vers.	8	9	9	rel.	Anz. Vers.	
Sorte	Züchter											
Max	* Bauer/IG	97	103	98		97	18	101	101	99	99	47
Symphony	* Nordsaat/SU	106	96	103		102	18	101	101	100	99	47
Apollon	* Nordsaat/SU	102	101	98		99	18	99	100	99	99	41
Delfin	* Nordsaat/Hauptsaaen	98	97	103		101	14	102	98	101	102	38
Armani	* IG Pflanzenzucht	100	101	101		102	10	99	102	101	101	32
Lion	* Nordsaat/SU	–	102	97		99	6	–	101	100	100	30
Standard dt/ha		45,7	45,9	50,2		58,8		70,9	69,3	82,6		76,7

* = Varianten des Standardmittels

¹⁾ = Werte werden nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten z. T. auch WP-Ergebnisse

vorläufige Ergebnisse LSV Hafer 2020 – **Eigenschaften**

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte		im Handel seit	Reife- zeit	Vermehrungsfl. bundesweit (Angaben in ha, 2020 vorläufig)			Rispen je m ²	Körner je Rispe	TKG	hl- Gewicht	Spelz- anteil* (+=wenig)	Reife- verzög. d. Strohes	Halm- länge (+=kurz)	Festigkeit gegen		
				2018	2019	2020								Lager	Halm- knicken	Mehl- tau
Max	G	2008	m	1.554	1.834	1.683	+	+	o	++	++	+	+	-	-	o
Symphony	W	2012	m	186	139	122	o	+	++	+	+	o	-	+	o	o
Apollon	G	2014	m	608	579	720	o	-	+++	+	+	-	-	+	o	o
Delfin	G	2016	m	379	644	662	o	+	++	+	+	--	o	+	+	++
Armani	G	2016	m	91	75	36	++	o	+	o	+	o	+	o	o	+
Lion	G	2018	m	-	95	420	o	+	+	++	++	o	o	+	+	o

o = durchschnittlich - = unterdurchschnittlich + = überdurchschnittlich m = mittel W = Weißhafer G = Gelbhafer