

Standort (Vers. Nr.)	BKR	Ernte-N _{min}				Boden- art	Standort- spezi- fische Feld- kapazität (9 dm)	Datum BOWAB	Aktueller Bodenwasser- gehalt	Beginn der Sickerwasser- bildung am	Angefallene Sickerwasser- menge	Fehlende Wasser- menge bis Feld- kapazität
		Kultur	N-Düngung Bzw. Versuchs- variante	N _{min} 0-90 cm [kg/ha]	Datum							
Hamerstorf (643)	46	Mais (konv)	N-Bedarfswert – 20 %	-	-	Su2	188 mm	24.01.21	187 mm	25.12.20	36 mm	1 mm
Thülsfelde (644)	50	Mais	N-Bedarfswert	36	22.09.20	fS	156 mm	24.01.21	155 mm	24.12.20	74 mm	1 mm
Wehnen (645)	50	Winterroggen (Block 1)	N-Bedarfswert	19	06.08.20	fSms	147 mm	24.01.21	> 147 mm	31.10.20	135 mm	0 mm
Wehnen (649)	50	Mais	240 kg N/ha	94	17.09.20	fSms	147 mm	24.01.21	> 147 mm	31.10.20	139 mm	0 mm
Schickels- heim (491b)	45	Winterweizen	210 kg N/ha	18	03.08.20	Ut3	298 mm	24.01.21	262 mm	-	-	36 mm
Dinklage (BDF033-L)	47	Wintergerste	N-Bedarfswert	-	24.07.20	fSms	149 mm	24.01.21	> 149 mm	25.07.20	146 mm	0 mm
Glissen (BDF049-L)	46	Mais	N- Bedarfswert	-	24.09.20	fSms	148 mm	24.01.21	> 148 mm	24.12.20	36 mm	0 mm
Meinersen (BDF056-L)	46	Mais	N-Bedarfswert	-	-	mSfs	134 mm	24.01.21	130 mm	30.12.20	26 mm	4 mm
Hohen- zethen (BDF064-L)	9	Mais	N-Bedarfswert	-	27.10.20	Sl2	182 mm	24.01.21	181 mm	07.01.21	28 mm	1 mm